

---

## Coronavirus Covid-19: Sip, 15 Faq su bambini e vaccino per rispondere ai dubbi dei genitori

I bambini allergici possono essere vaccinati? Bisogna assumere paracetamolo prima del vaccino per prevenire gli effetti avversi? Prima della vaccinazione è opportuno controllare se si hanno gli anticorpi? È utile vaccinare gli adolescenti con malattie reumatologiche? Sono state pubblicate sul sito della Società italiana di pediatria (Sip) 15 [Faq](#) da consultare agilmente, redatte dagli esperti Sip sulla scorta della letteratura ad oggi disponibile sulle vaccinazioni Covid-19. Una mappa aggiornata, dedicata soprattutto al personale operante nell'attività vaccinale Covid-19, ma utile anche per le famiglie e per chi fa informazione. "Tutti i bambini con allergie possono essere vaccinati. I pazienti con pregresse reazioni anafilattiche devono rimanere in osservazione 60 minuti. I pazienti con allergie note ai componenti del vaccino dovrebbero consultarsi con un allergologo ed effettuare la vaccinazione in ambiente protetto", si legge tra l'altro nelle Faq. L'assunzione di antinfiammatori o paracetamolo prima della vaccinazione anti-Covid "non è stata studiata e potrebbe ridurre la risposta immune dell'organismo al vaccino - spiegano ancora i pediatri -. Paracetamolo o altri antinfiammatori non steroidei come l'ibuprofene possono essere invece assunti dopo la vaccinazione per gestire eventuali effetti collaterali". E per quanto riguarda i bambini con malattie croniche, "tutti devono essere vaccinati in quanto corrono rischi maggiori di morte e ospedalizzazione".

Giovanna Pasqualin Traversa