
Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, "si registra un ulteriore leggero aumento dei casi diagnosticati"

"L'incidenza settimanale a livello nazionale evidenzia un ulteriore leggero aumento dei casi diagnosticati e si mantiene sopra la soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti". Lo si legge nel monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sulla situazione Covid-19 relativo al periodo 2-8 agosto 2021. "Continua l'aumento dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 68 per 100.000 abitanti (02/08/2021-08/08/2021) vs 62 per 100.000 abitanti (26/07/2021-01/08/2021), dati flusso ISS. L'incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti", la fotografia offerta. Nel periodo 21 luglio-3 agosto 2021, "l' R_t medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,27 (range 1,07- 1,65), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica". Si osserva "una leggera diminuzione anche dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero ($R_t=1.2$ (1.14-1.25) al 3/8/2021 vs $R_t=1.24$ (1.18-1.32) al 27/7/2021) che si mantiene tuttavia al di sopra della soglia epidemica". La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai [dati epidemiologici](#) pubblicati dall'Istituto superiore di sanità va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità. Ancora: "La circolazione della variante delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione europea ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale. - Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. - È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale.

Gigliola Alfaro